

Contraception d'urgence: comparaison

Situation	Remise de lévonorgestrel	Remise d'acétate d'ulipristal
0 – 72h après RSNP	Oui	Oui
72 – 120h après RSNP	Non	Oui
Âge < 16 ans Evaluer la capacité de discernement	Oui	Oui
RSNP sans contraceptif hormonal	Oui	Oui
RSNP sous contraceptif hormonal dont l'effet est insuffisant	Oui <ul style="list-style-type: none"> ▪ Procédure selon contraceptif et moment de l'oubli ▪ Si CU nécessaire: + préservatif durant 7 jours 	Oui <ul style="list-style-type: none"> ▪ Procédure selon contraceptif et moment de l'oubli ▪ Toujours + préservatif durant 14 jours ▪ IA avec gestagènes: réduction de l'efficacité d'UPA démontrée dans des études
Allaitement	Oui Interrompre l'allaitement durant 6 h	Oui Interrompre l'allaitement durant 7 jours
Prise répétée au cours du même cycle	Oui Si 1 ^e prise LNG, répéter LNG	Oui Si 1 ^e prise UPA, répéter UPA
Surpoids / BMI élevé	Oui	Oui

Abréviations:

RSNP: Rapport sexuel non protégé; **IA:** Interaction; **UPA:** Acétate d'ulipristal; **LNG:** Lévonorgestrel

Cycle menstruel




Image: ©PCRG

Cycle menstruel sous contraceptif hormonal





Image: ©PCRG

Cycle menstruel: durée très variable!


Exemple 1: cycle de 42 jours avec ovulation le 28^e jour



Exemple 2: cycle de 35 jours avec ovulation le 21^e jour



Exemple 3: cycle de 28 jours avec ovulation le 14^e jour



Exemple 4: cycle de 21 jours avec ovulation le 7^e jour




Image: ©PCRG